



# NARLISIM®

Soluzione per uso nasale e per aerosolterapia  
15 flaconcini richiudibili da 2,5 ml



## INDICAZIONI

**NARLISIM®** è un dispositivo medico indicato in caso di ostruzione nasale per favorire l'eliminazione del muco; il prodotto può anche essere utilizzato come complemento dei trattamenti contro le affezioni più comuni dell'apparato respiratorio (raffreddore comune, sinusite, rinite allergica).

I flaconcini, pronti all'uso, sono indicati per il trattamento delle vie aeree superiori. I flaconcini possono essere utilizzati sia per l'aerosolterapia che in gocce nasali.

## COMPOSIZIONE

Pirometaxina® (Acido Pirrolidon Carbossilico e Solfato di rame pentaidrato), Glicerolo vegetale, Sodio cloruro, Acqua depurata.

## AEROSOLTERAPIA

Per una ottimale distribuzione del preparato nelle vie aeree superiori, se ne raccomanda l'uso attraverso doccia nasale micronizzata da applicare ai comuni apparecchi per aerosolterapia di tipo pneumatico.

**NARLISIM®** può anche essere usato con tutte le tipologie di apparecchi per aerosol (di tipo pneumatico o ad ultrasuoni): in questo caso, sempre per una migliore distribuzione nelle vie aeree superiori, se ne consiglia l'uso con forcilla nasale.

## ISTRUZIONI PER L'USO NELL'AEROSOLTERAPIA

- Soffiare il naso.
- Staccare un flaconcino e aprirlo girando la parte superiore.
- Versare l'intero contenuto di 1 – 2 flaconcini nell'apposito contenitore dell'apparecchio per aerosol. Seguire le indicazioni dell'apparecchio ed inalare fino a completo svuotamento dell'ampolla. Non utilizzare eventuale soluzione residua nel flaconcino.

## POSOLOGIA NELL'AEROSOLTERAPIA

Nel bambino sopra i 3 anni e nell'adulto: 1 flaconcino 1 – 2 volte al giorno oppure 2 flaconcini 1 volta al giorno.

## SOLUZIONE PER USO NASALE

### ISTRUZIONI PER L'USO IN GOCCE

- Soffiare il naso.
- Staccare un flaconcino e aprirlo girando la parte superiore.
- Inclinare la testa di lato ed indietro, introdurre la punta del contenitore nella narice e premere leggermente erogando la posologia consigliata.
- Ripetere la stessa operazione per l'altra narice.
- Rialzare la testa per lasciare defluire il muco e asciugare il prodotto eccedente.
- Evitare di soffiare il naso subito dopo la somministrazione del prodotto per prolungarne l'azione.
- Richiudere il flaconcino accuratamente e conservarlo in luogo asciutto e lontano da fonti di calore e dalla luce. Il flaconcino può essere utilizzato entro 12 ore dalla prima apertura.



### POSOLOGIA IN GOCCE

Nel bambino sopra i 3 anni e nell'adulto: 2-3 gocce per narice fino ad un massimo di sei somministrazioni giornaliere.

### AVVERTENZE

- Il prodotto è per uso nasale in gocce e per aerosol secondo le istruzioni sopra indicate . Non ingerire.
- Non utilizzare il prodotto per un periodo continuativo superiore a 28 giorni.
- L'utilizzo nei bambini deve essere sotto la supervisione di un adulto.
- Utilizzare un flaconcino per un solo soggetto.
- Il contenuto del flaconcino è utilizzabile entro 12 ore dalla prima apertura.
- Utilizzare solo su mucosa integra.
- Non usare in caso di ipersensibilità e di incompatibilità verso qualsiasi componente del prodotto. Una lieve e temporanea sensazione di bruciore può essere avvertita all'applicazione ed è legata alle caratteristiche della soluzione necessarie per assicurarne l'efficacia.
- Nei bambini al di sotto dei tre anni, in gravidanza ed in caso di terapie farmacologiche concomitanti il prodotto può essere utilizzato dietro parere medico.
- Consultare il medico previo utilizzo del dispositivo medico in concomitanza con principi attivi farmaceutici o altre tipologie di prodotto.
- L'uso prolungato del prodotto, come per tutti i prodotti topici, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione o irritazioni locali, ove ciò accada interrompere il trattamento e consultare il proprio medico curante o il farmacista.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.
- Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Tenere il prodotto fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

### CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore (temperatura consigliata compresa tra 10 e 30 °C) e al riparo della luce. La data di scadenza, riportata sulla confezione e su ogni flaconcino, si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

### EFFETTI COLLATERALI

Non sono noti effetti collaterali correlati all'utilizzo del prodotto. Le prove eseguite sul prodotto ad oggi, non hanno evidenziato fenomeni di sensibilizzazione o altri effetti collaterali. In caso di comparsa di fastidi consultare il Medico.

### CONFEZIONE

15 flaconcini richiudibili da 2,5 ml. Il prodotto non contiene conservanti.



### FABBRICANTE

LABORATORI BALDACCI S.p.A. - Via S. Michele degli Scalzi, 73 – 56124 PISA

**NARLISIM®** è un Dispositivo Medico classificato e prodotto in ottemperanza alle prescrizioni della Direttiva 93/ 42/ CEE e successivi aggiornamenti.

**Data di ultima revisione: Novembre 2019**

CE 1370

Legenda dei simboli	
	Numero di lotto
	Data di scadenza
	Fabbricante
	Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso
	Leggere attentamente le avvertenze
	Sterile per filtrazione